

MẪU NHÃN

1. Nhãn trên vỉ 10 viên :



Lô SX, HD : In chìm trên vỉ

2. Nhãn trên hộp giấy 30 viên :



Handwritten signature



Đà Nẵng ngày 11 tháng 01 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



Handwritten signature

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC	
VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM	
DACOLFORT	
Thành phần: Mỗi viên bao phim chứa	
- Diosmin – Hesperidin (9:1)	: 500 mg
- Tá dược (Lactose, amidon, PVP K30, DST, magnesi stearat, aerosil, HPMC 615, HPMC 606, talc, titan dioxit, polyethylen glycol 6000, màu oxid sắt đỏ, màu oxid sắt vàng) vừa đủ.....	: 1 viên
Dược lực học : Tăng trương lực tĩnh mạch và bảo vệ mạch	
Dược động học: Diosmin bài tiết chủ yếu qua phân, trung bình có 14% liều dùng được bài xuất qua nước tiểu. Thời gian bán thải là 11 giờ. Thuốc được chuyển hóa mạnh mẽ, bằng chứng là có những acid phenol khác nhau ở nước tiểu.	
Chỉ định : Điều trị những triệu chứng có liên quan đến suy tĩnh mạch- mạch bạch huyết (nặng chân, đau, chân khó chịu vào buổi sáng). Điều trị các dấu hiệu chức năng có liên quan tới cơn trĩ cấp.	
Liều lượng và cách dùng : Liều dùng thông thường: mỗi ngày 2 viên, uống làm 2 lần vào bữa ăn trưa và bữa tối. Cơn trĩ cấp: 4 ngày đầu mỗi ngày 6 viên, sau đó 3 ngày mỗi ngày 4 viên.	
Chống chỉ định : Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc. Trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú. Suy tim mất bù chưa điều trị, suy gan, thận nặng, giảm kali máu.	
Thận trọng : Cơn trĩ cấp: - Việc dùng thuốc không thay thế cho điều trị đặc hiệu chữa các bệnh chứng khác của hậu môn. Điều trị phải ngắn hạn. - Nếu các triệu chứng không mất đi nhanh chóng, cần tiến hành khám hậu môn và xem lại cách điều trị	
Tác dụng ngoại ý : Đã có báo cáo về một số trường hợp rối loạn tiêu hóa và rối loạn thần kinh thực vật, không cần ngừng điều trị. <i>- Thông báo ngay cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn mà bạn gặp phải trong thời gian dùng thuốc.</i>	
Tương tác thuốc: Không nên phối hợp với lithium Thận trọng khi dùng đồng thời với muối kali, lợi niệu giữ kali, thuốc gây loạn nhịp, gây mê, thuốc trị tăng HA khác. Để tránh các tương tác có thể xảy ra giữa các thuốc, phải luôn luôn báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn hiện đang được điều trị bất cứ một thuốc nào khác.	



Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú :

Không nên sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai do chưa có đủ thông tin về tính an toàn. Do chưa có dữ liệu về việc bài xuất của thuốc vào sữa, không nên cho con bú khi đang dùng thuốc.

Sử dụng thuốc ở người lái xe và vận hành máy móc:

Do có thể xảy ra những tác dụng phụ có liên quan đến thần kinh thực vật, cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho người thường xuyên lái xe và vận hành máy móc.

Khuyến cáo :

- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ
- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc có nghi ngờ về chất lượng của thuốc như : viên bị biến màu, viên bị ướt.

Trình bày và bảo quản :

Thuốc ép trong vỉ bấm 10 viên, hộp 3 vỉ kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.
Đề thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30⁰C. **ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM.**

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 – Dũng Sĩ Thanh Khê – TP. Đà Nẵng

Tel : 0511.3760130

Fax : 0511.760127

Email : info@danapha.com

Số điện thoại tư vấn: 0511.3760131

Và được phân phối trên toàn quốc.

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Mai Đăng Dấu

